

Pandas Italia

Associazione di Volontariato Onlus

Sede Legale: Ospedale San Giuseppe - Reparto di Pediatria
Via Boccaccio, 20 50053 Empoli (FI) Toscana - Italia
pandasitalia@gmail.com www.pandasitalia.it

Le Terapie per la sindrome P.A.N.D.A.S. Gli Antibiotici

Molti bambini reagiscono adeguatamente anche ai soli antibiotici. In effetti, se il meccanismo del processo autoimmune fosse bloccato all'insorgenza dei primi sintomi (entro 30 giorni) con gli antibiotici, ci sarebbero molte probabilità di arresto della malattia.

Purtroppo la **maggior parte dei bambini riceve una diagnosi di P.A.N.D.A.S. dopo 3 o 4 mesi dall'insorgenza dei sintomi**, quando il processo autoimmune è ormai avviato. (da: "Pandasnetwork")

Vi proponiamo quanto riportato sempre in Pandasnetwork (con l'autorizzazione della Sig.ra Pohlman, autrice del sito). Vi si legge:

"I bambini P.A.N.D.A.S. si dividono in due categorie:


- **quelli che hanno una rapida cessazione dei sintomi** con un normale ciclo di antibiotici
- **quelli che NON hanno una rapida cessazione dei sintomi** con un normale ciclo di antibiotici

I primi sono candidati alla terapia profilattica con antibiotici alla seconda manifestazione dei sintomi (cioè dopo che ripresentano infezione da streptococco). Questi bambini calzano appieno tutti e 5 i criteri diagnostici descritti dalla Dr.ssa Swedo:

1. esordio improvviso di OCD/tic
2. esordio in età pre-puberale
3. corso episodico della severità dei sintomi
4. associazione dei sintomi con infezione SBEGA
5. anormalità neurologiche

AVVISO ai lettori:

vogliate tener presente che il seguente testo non è provenienza medica ma frutto di esperienze e di ricerche effettuate da genitori di bimbi P.A.N.D.A.S.



Pandas Italia

Associazione di Volontariato Onlus

Sede Legale: Ospedale San Giuseppe - Reparto di Pediatria
Via Boccaccio, 20 50053 Empoli (FI) Toscana - Italia
pandasitalia@gmail.com www.pandasitalia.it

I **secondi** non presentano “corso episodico della severità dei sintomi” descritto dalla Swedo e **NON migliorano dopo un normale ciclo di antibiotici**. I loro sintomi sono di natura “encefalitica”, la reazione infiammatoria peggiora nel tempo e richiede molti mesi per arrestarsi.

La terapia con abx deve essere prolungata per un minimo di 6 settimane, al fine di ottenere una buona (ma non completa) remissione dei sintomi. Il processo autoimmune è stabile, in questi casi e, se dopo molti mesi il bambino continua a ripresentare peggioramento dei sintomi dopo ogni infezione, anche lieve (raffreddori, influenza ecc.) potrebbe essere il momento di considerare le altre tre terapie alternative. [...].

Il ruolo degli antibiotici, nella guarigione di un bambino con P.A.N.D.A.S., può essere più complesso della semplice eradicazione dell'infezione e della prevenzione di infezioni successive [...].

Per quanto riguarda i tipi di antibiotici che i medici usano nella cura della P.A.N.D.A.S. rimandiamo alla lettura del sito di PANDASNETWORK. Avvisiamo che, rispetto agli USA, le vedute italiane sono leggermente diverse. Rimandiamo altresì, obbligatoriamente, al parere dei medici italiani, sebbene anche fra questi vi siano delle diversità nella somministrazione del tipo di antibiotici e nella durata della terapia.

Un'altra importante informazione che troviamo sempre in “Pandasnetwork” è questa:

“I medici raccomandano che un bimbo con PANDAS continui la terapia antibiotica fino ai 21 anni di età, come sottolineato nell’[American Academy of Pediatrics Journal](#)”.

AVVISO ai lettori:

vogliate tener presente che il seguente testo non è provenienza medica ma frutto di esperienze e di ricerche effettuate da genitori di bimbi P.A.N.D.A.S.